

Brandt® Smart Zn



Fertilizante Foliar Líquido

Composición

p/p

Nitrógeno total sin nitratos (N)	6,0%
Azufre de sulfatos (S)	3,0%
Zinc (Zn)	6,0%

pH: 2,5

Densidad: 1,27 g/ml

GRADO: 6-0-0

Contenido neto: 10 L

Registro SENASA N°: 16.628

Lote No: XXXXXXX

Fecha de Fabricación: DD/MM/YYYY

Fecha de Vencimiento: DD/MM/YYYY3

Importador y Distribuidor:



Vertisoles S.R.L.
Av. Presidente J.D. Perón s/Nro.
Parque Industrial Concordia, Sector 3, Lote 1
(3200) Concordia
Pcia. de Entre Ríos, Argentina
Tel.: (0345) 4290 0944
www.vertisoles.com.ar

Registrado por:
Registros Agropecuarios S.R.L.
Alsina 1441 - 2 Piso Of. 206 (1088) C.A.B.A.
Tel. 5238-3588 / 89

Fabricante:

Brandt Consolidated, Inc.
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711 USA
+1 217 547 5840
www.brandt.co
Origen: EE.UU.

2017-10

Brandt® Smart Zn

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

BRANDT SMART Zn es un fertilizante ideado para aplicación foliar con aporte de Nitrógeno, Azufre y Zinc en aquellos cultivos que presenten deficiencias.

INSTRUCCIONES DE USO, DOSIS Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN

Agregue agua al tanque hasta la mitad. Si es necesario agregue otros productos compatibles y agite. Agregue BRANDT SMART Zn y agite. Llenar el tanque hasta su capacidad final, con agitación continua.

APLICACIÓN

Evite aplicar BRANDT SMART Zn en horas del día con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y/o vientos fuertes. Para aplicaciones foliares utilice un volumen mínimo de 40 L/ha de agua en aplicaciones aéreas y 100 L/ha de agua en aplicaciones con equipos terrestres.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, lo que permite que sea aplicado conjuntamente con los tratamientos fitosanitarios. Ante cualquier duda realizar una prueba previa de compatibilidad, especialmente para mezclas de alto pH ó ricas en fosfatos.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Dosis	Momento y Número de Aplicaciones
Soja	1-3 L/ha	1 aplicación durante estadíos vegetativos tempranos y repetir si existieran deficiencias
Maíz	1-3 L/ha	Una aplicación durante estadíos vegetativos tempranos y previos a encañazón.
Arroz, Trigo, Avena, Centeno, Cebada	1-3 L/ha	Aplicar desde estadíos vegetativos tempranos.

LA FERTILIZACIÓN FOLIAR ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE SUELO.

UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON UN TENSIÓACTIVO NO POLAR NO IÓNICO EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,5 AL 1%.

NO APLICAR EN HORAS DE EXCESIVO CALOR O GRAN INSOLACIÓN.

Las dosis pueden variar según zona, suelo o cultivo, consulte con un Ingeniero Agrónomo.

AVISO DE GARANTÍA: El formulador garantiza que la composición física y química del producto corresponde a lo descrito en la etiqueta; el uso, almacenamiento y transporte está fuera de su control por lo que el comprador asume todo riesgo.